





Purchased from the CULLMAN ENDOWMENT











D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONES INSECTORVM

CIRCA RATISBONAM

INDIGENORVM

COLORIBVS NATURAM REFERENTIBVS
EXPRESSAE.

VOLVMEN II.

Natürlich ausgemahlte

Abbildungen

Regensburgischer


Infecten.

Zweyter Band.



RATISBONAE

TYPIS BREITFELDIANIS. MDCCLXXIX.



8 QL 466 5330 1779X 62 SCNHRB

INSECTA RATISBONENSIA, VOL. II.

Regensburgische
Insecten.
Zweyter Band.

TABVLA CI. Hundert und erfte Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace cylindraceo NONA.

 Neunter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Bruftschilde.
- Fig. II. III. PHALAENA pettinicornis alis deflexis DECIMA QVINTA.


 Funfzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden

 Flügeln.
- Fig. IV. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS PRIMVS. Ein und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA.

 Zehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Bruftschilde.
- Fig. VI. CVRCVLIO femoribus mutic's DECIMVS NONVS.

 Neunzehender Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ semilunato DVODECIMA. Zwölfte Spinne mit Augen im halben Monde.


TABVLA CI.



 \mathcal{F}_{ig} . II .

 \mathcal{F}_{ig} . V .

TABVIA CIL.



Loibel pinx . Rat.

I. M. Fridrich se . Rat .

TABVLA CII. Hundert und zweyte Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA seticornis alis convolutis TERTIA.

 Dritter Nachtsalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.
- Fig. III. SCARABAEVS septem antennarum lamellis QVARTVS. MAS. Vierter Maulwurfskäfer mit siebenspaltigen Fühlhörnern. Männgen.
- Fig. IV. SCARABAEVS septem antennarum Iamellis QVINTVS. FEMINA. Fünfter Maulwurfskäfer mit siebenspaltigen Fühlhörnern, Weibgen,
- Fig. V. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS PRIMVS. Ein und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VI. MVSCA fpathula antennarum oblonga DECIMA QVARTA.

 Vierzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. VII. VIII. APIS TRICESIMA QUINTA. Fünf und dreyfsigste Biene.

TABVLA CIII. Hundert und dritte Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SECVIDVS.

 Zwey und funfzigste Sclupfwespe.
- Fig. II. III. CRABRO QVINTVS.

 Fünfte Kolbenfliege.
- Fig. IV. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS TERTIVS. Drey und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. LEPTVRA thorace plano DECIMA SEXTA.

 Sechzehender Afterholzkäfer mit flachem Brussschilde.
- Fig. VI.

 LEPTVRA thorace plano DECIMA SEPTIMA.

 Siebenzehender Afterholzkäfer mit flachem Bruftschilde.
- Fig. VII. a.b. $\stackrel{\circ}{C}$ VRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS. Zwanzigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkelm.
- Fig. VIII. a.b. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS PRIMVS.

 Ein und zwanzigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.


TABVLA CIII.



Loibel pinx . Rat .

I. M. Fridrich sc. Rat.

TABVIA CIV.



Loibel pinx . Rat

TABVLA CIV. Hundert und vierte Tafel.

- Fig. I. II. CRABRO SEXTVS.
 Sechste Kolbenfliege.
- Fig. III. MVSCA spathula antennarum fusiformi QVARTA. Vierte Haussliege mit spindelförmigem Spadel,
- Fig. IV. RHINOMACER DECIMVS QVARTVS.

 Vierzehender Afterrüffelkäfer.
- Fig. V. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS SECVNDVS.

 Zwey und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VI. a.b. ELATER antennis setaceis NONVS.

 Neunter Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. CVRCVLIO semoribus muticis VICESIMVS TERTIVS.

 Drey und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VIII. IX. BIBIO SECUNDUS.

 Zweyte Marcusfliege.
- Fig. X. XI. BIBIO TERTIVS.
 Dritte Marcusfliege.

TABVLA CV. Hundert und fünfte Tafel.

- Fig. I. II. APIS TRICESIMA SEXTA.


 Sechs und dreyfsigste Biene.
- Fig. III. IV. PHALAENA seticornis alis desexis DECIMA SEXTA.

 Sechzehender Nachtfalter mit borsligen Fühlhörnern und abhangenden


 Flügeln.
- Fig. V. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS QVARTVS. Vier und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. TENTHREDO antennis setaceis SEPTIMA. Siebende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. TENTHREDO antennis filiformibus QVINTA. Fünfte Sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. a.b. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS QVARTVS.

 Vier und zwanzigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. IX. a.b. TELEPHORVS ouatus QVINTVS. Fünfter eyrunder Warzenkäfer.

TABVLA CV.



TABVLA CVI.



Loidel pinx . Rat .

I.M.F. sc: R

TABVLA CVI. Hundert und fechste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis patentibus NONA.

 Neuntes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. APIS TRICESIMA SEPTIMA.
 Sieben und dreyssigste Biene.
- Fig. III. ASILVS DECIMVS QUARTUS. Vierzehende Raubfliege.
- Fig. IV. ARANEA oculorum situ duarum linearum TERTIA.

 Dritte Spinne mit Augen in zwo Reihen.
- Fig. V. VI. TIPVLA alis patentibus DECIMA. MAS. Zehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. VII. TIPVI. A alis patentibus VNDECIMA. FEMINA. Eilfte Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

TABVLA CVII. Hundert und siebende Tafel.

- Fig. I. HEMEROBIVS TERTIVS.

 Dritter Blattlauslöwe.
- Fig. II.

 LEPTVRA thorace globoso DVODECIMA.

 Zwölster Afterholzhäfer mit kugelichem Brustschilde.
- Fig. III. LEPTVRA thorace globoso DECIMA TERTIA.

 Dreyzehender Afterholzkäfer mit kugelichem Brustschilde.
- Fig. IV. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS QVINTVS. Fünf und funfzigste Schlupswespe.
- Fig. V. MVSCA spathula antennarum rotunda DVODECIMA. Zwölfte Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. MVSCA spathula antennarum rotunda DECIMA TERTIA.

 Dreyzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VII. MVSCA spathula antennarum rotunda DECIMA QVARTA.

 Vierzehende Haussliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CVII.

















Loibel pinx . Rat .

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CVIII.















Fig. VIII.



TABVLA CVIII. Hundert und achte Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace plano DECIMA OCTAVA.

 Achtzehender Afterholzbock mit flachem Bruftschilde.
- Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis destexis DECIMA SEPTIMA. Siebenzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA seticornis alis deservis DECIMA OCTAVA.

 Achtzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlkörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VI. MVSCA spathula antennarum truncata TERTIA.

 Dritte Haussliege mit abgestutztem Spadel.
- Fig. VII. MVSCA spathula antennarum oblonga DECIMA QVINTA. Funfzehende Haussliege mit länglichem Spadel.
- Fig. VIII. CAR ABVS oblongus DECIMVS SEPTIMVS. Siebenzehender länglicher Laufkäfer.


TABVLA CIX. Hundert und neunte Tafel.

- Fig. I. TENTHREDO antennis setaceis o CTAVA. Achte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. II. TENTHREDO antennis clauatis VNDECIMA. Eilfte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. III. IV. PHRYGANEA QVINTA.
 Fünfte Frühlingsfliege.
- Fig. V. CARABVS oblongus DECIMVS OCTAVVS.

 Achtzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. VI. BVPRESTIS DECIMA QVARTA. Vierzehender Stinkkäfer.
- Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SECVEDVS. Zwey und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VIII. IX. CIMEX quinque antennarum articulis VICESIMVS SEXTVS.

 Sechs und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.


TABVLA CIX.



Loibel pine. Rat.

I. M. Frdrich sc. Rat.

TABVLA CX.



TABVLA CX. Hundert und zehende Tafel.

- Fig. I. II. SPHINX alis integris cauda simplici DVODECIMA.

 Zwölfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem
 Schwanze.
- Fig. III. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SEXTVS. Sechs und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. V. STRATIOMYS OCTAVA.

 Achte Waffenfliege.
- Fig. VI. TENTHREDO antennis setaceis NONA.

 Neunte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.

TABVLA CXI. Hundert und eilfte Tafel.

- Fig. I. ICHNEV MON QVINQVAGESIMVS SEPTIMVS. Sieben und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. III. SPHINX alis integris cauda pilosa TERTIA.

 Dritter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanze.
- Fig. IV. COCCVS PRIMVS. FEMINA. Erste Schildlaussliege. Weibgen.
- Fig. V. TIPVLA alis patentibus DVODECIMA. MAS. Zwülfte Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. VI. TIPVLA alis patentibus DECIMA TERTIA. FEMINA. Dreyzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. VII. PHALAENA pedinicornis alis patentibus SEXTA.

 Sechster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABVLA CXI.



 $\mathscr{F}_{ig}^{-}H$.



Fig. V.

Fig. IV.



 $\mathcal{F}_{ig}.VII$.



Fig. III .




Fig.VI.



Loibel pinx . Rat .

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CXII.



TABVLA CXII. Hundert und zwölfte Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA seticornis alis planis DECIMA QVINTA.

 Funfzehender Nachtfalter mit borsligen Fühlhörnern und slachen Flügeln.

 Fig. III. CHRYSOMELA TRICESIMA.

 Dreyssigster Blattkäfer.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace conico DECIMA SEXTA.

 Sechzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. APIS TRICESIMA OCTAVA.

 Acht und dreyfsigste Biene.
- Fig. VI. BOMBYLIVS SEXTVS. Sechste Rüffelfliege.
- Fig. VII. CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS SECVNDVS. Zwey und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. ARANEA oculorum fitu semilunato DECIMA TERTIA.

 Dreyzehen de Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. IX. PHALAENA seticornis alis patentibus OCTAVA.

 Achter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABVLA CXIII. Hundert und dreyzehende Tafel.

- Fig. I. MVSCA spathula antennarum rotunda DECIMA QVINTA. Funfzehende Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. APIS TRICESIMA NONA.


 Neun und dreyfsigste Biene.
- Fig. III. VOLVCELLA OCTAVA.

 Achte Federbuschfliege.
- Fig. IV. LIBELLVLA alis patentibus DECIMA. Zehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. V. VI. PHALAENA feticornis alis deflexis DECIMA NONA.

 Neunzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden

 Flügeln.
- Fig. VII. TENTHREDO antennis setaceis DECIMA. zehende Sägfliege mit borstigen Fühlhürnern.
- Fig. VIII. VESPA DECIMA SEXTA. Sechzehende Wespe.
- Fig. IX. ARANEA oculorum fitu duarum linearum QVARTA. Vierte Spinne mit Augen in zwo Reihen.


TABVLA CXIII.



Loibel pina. Rat.

I.M.F. sc.R.

TABVLA CXIV.



TABVLA CXIV...

Hundert und vierzehende Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS OCTAVVS.

 Acht und funfzigste Sclupfwespe.
- Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis desexis VICESIMA.

 Zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden
 Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA seticornis alis dessevis VICESIMA PRIMA.

 Ein und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VI. a.b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS TERTIVS. Drey und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VII. NEMOTELVS DVODECIMVS. Zwölfte Stiletfliege.
- Fig. VII. TENTHREDO antennis clauatis DVODECIMA.

 Zwölfte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

TABVLA CXV. Hundert und funfzehende Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA seticornis alis desevis VICESIMA SECVNDA.

 Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. III. CHRYSIS QUARTA.
- Fig. IV. TENTHREDO antennis setaceis VNDECIMA. Eilste Sägsliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. V. TIPVLA alis patentibus DECIMA QVARTA. MAS.

 Vierzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. VI. TIPVLA alis patentibus DECIMA QVINTA. FEMINA. Funfzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. VII. STENOCORVS thorace inermi DECIMVS TERTIVS.

 Dreyzehender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABVLA CXV.











Fig. II.




Fig.VII.



Fig. VI.

I.G. Fridrich sc. Rat

Loibel pinoc . Rat.

TABVLA CXVI.













Fig. VII . .



Loibel poux Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CXVI.

Hundert und sechzehende Tafel.

- Fig. I. LBELLVI. A alis eredis SEXTA.

 Sechstes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis desexis VICESIMA TERTIA.

 Drey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. IV. TENTHREDO antennis pedinatis QVINTA. Fünfte Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. V. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS NONVS. Neun und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. Sechzigste Schlupswespe.
- Fig. VII. STENOCORVS thorace inermi DECIMVS QVARTVS.
 Vierzehender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABVLA CXVII. Hundert und fiebenzehende Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis erectis SEPTIMA. Siebendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. II. VESPA DECIMA SEPTIMA. Siebenzehende Wespe.
- Fig. III. VESPA DECIMA OCTAVA.


 Achtzehende Wefpe.
- Fig. IV. LIBELLVLA alis erettis octava.

 Achtes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. V. LIBELLVLA alis erectis NONA.

 Neuntes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VI. TIPVLA alis patentibus DECIMA SEXTA. FEMINA. Sechzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. VII. PHALAENA seticornis alis desexis VICESIMA QVARTA.

 Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

TABVLA CXVII.



TABVLA CXVIII.


















Loibet pinx . R

I.M.F.sc.R.

TABVLA CXVIII. Hundert und achtzehende Tafel.

- Fig. I. DERMESTES QVARTUS.
 Vierter Speckkäfer.
- Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis desexis VICESIMA QVINTA.

 Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. IV. MVSCA spathula antennarum oblonga DECIMA SEXTA. Sechzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. V. VI. PHALAENA seticornis alis defenis VICESIMA SEXTA.

 Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VII. STENOCORVS thorace inermi DECIMVS QVINTVS. Funfzehender Stutzkäfer mit flachellofem Bruftschilde.

TABVLA CXIX. Hundert und neunzehende Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA seticornis alis planis DECIMA SEXTA.

 Sechzehender Nachtfalter mit borsligen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. III. CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS TERTIVS.

 Drey und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. ICHNEVMON SEXAGESIMVS PRIMVS. Ein und fechzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SECVEDUS.

 Zwey und fechzigste Schlupswespe.
- Fig. VI. STRATIOMYS NONA.

 Neunte Waffenfliege.

Fig. VII. VIII. PHALAENA seticornis alis destevis vicesima septima.

Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

TABVLA CXIX.


















I.G.F.sc.R

TABVLA CXX.



Loibet pince . R . .

L.G.F.sc.R.

TABVLA CXX.

Hundert und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis angulatis SECVNDVS.

 Zweyter fechsfüssiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. MVSCA spathula antennarum rotunda DECIMA SEXTA. Sechzehende Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. LIBELLVLA alis erectis DECIMA.

 Zehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. V. LIBELLVLA alis erectis VNDECIMA.

 Eilftes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln,
- Fig. VI. LIBELLVLA alis erettis DVODECIMA.

 Zwölftes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VII. ICHNEVMON SEXAGESIMVS TERTIVS.

 Drey und fechszigste Schlupfwefpe.
- Fig. VIII. ICHNEVMON SEXAGESIMVS QUARTUS.

 Vier und sechzigste Sclupfwespe.

TABVLA CXXI.

Hundert ein und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. TETIGONIA SECUNDA. Zweyte Singfliege.
- Fig. III. BOMBYLIVS SEPTIMVS. Siebende Rüffelfliege.
- Fig. IV. LIBELLVLA alis eredis DECIMA TERTIA.

 Dreyzehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. V. LIBELLVLA alis erectis DECIMA QVARTA.

 Vierzehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VI. VROCERVS TERTIVS.
 Dritte Schwanzsliege.

TABVIA CXXI.





Fig. III .



Fig. IV.



 $\mathcal{F}_{ig}.VI$.



 \mathcal{F}_{ig} . V .




Loibel pinx . R .

I.G. F. sc. R.

TABVLA CXXII.















Loibel pina. R.

I.G.F.se.R.

TABVLA CXXII.

Hundert zwey und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. PHALAENA seticornis alis desexis VICESIMA OCTAVA.

 Acht und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. II. III. PHRYGANEA SEXTA.
 Sechste Frühlingsfliege.
- Fig. IV. PHALAENA pedinicornis alis patentibus SEPTIMA.
 Siebender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. V. PHALAENA petinicornis alis patentibus octava.

 Achter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VI. VESPA DECIMA NONA.
 Neunzehende Wespe.
- Fig. VII. TABANVS QVINTVS. Fünfte Bremsenfliege.

TABVLA CXXIII.

Hundert drey und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX DECIMVS TERTIVS. Dreyzehender Holzkäfer.
- Fig. II. III. CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS QVARTVS. Vier und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS QVINTVS.

 Finf und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. V. PHALAENA seticornis alis patentibus NONA.

 Neunter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VI.

 PHALAENA seticornis alis patentibus DECIMA.

 Zehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABVLA CXXIII.



 \mathcal{F}_{ig} . II .



 \mathcal{F}_{ig} . III .



 \mathcal{F}_{ig} . IV .




Fig. V.

Fig.VI.

Loibel pinx . Rat .

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVIA CXXIV.



TABVLA CXXIV.

Hundert vier und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II.

 PHALAENA pedinicornis alis deflexis VICESIMA QVARTA.

 Vier und zwanzigser Nachtfalter mit borsligen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. III. CERAMBYX DECIMVS QUARTUS. Vierzehender Holzkäfer.
- Fig. IV. TABANVS SEXTVS.
 Sechste Bremfenfliege.
- Fig. V. MVSCA spathula antennarum rotunda DECIMA SEPTIMA. Siebenzehende Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ quadrato SEXTA.

 Sech ste Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CXXV.

Hundert fünf und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis patentibus VNDECIMA. Eilftes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis destexis VICESIMA NONA.

 Neun und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA feticornis alis patentibus VNDECIMA.

 Eilfter Nachtfalter mit borftigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VI. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA TERTIA.

 Dreyzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA QVARTA. Vierzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

TABVLA CXXV.
















 \mathcal{F}_{i} .VI



Loibel pince Rat

I.G.Fridrich so R .

TABVLA CXXVI.



Loibel pince . R

I. M. F. sc.R.

TABVLA CXXVI.

Hundert fechs und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. CHRYSOMELA TRICESIMA PRIMA. Ein und dreyfsigster Blattkäfer.
- Fig. II. PHALAENA seticornis alis planis DBCIMA SEPTIMA.
 Siebenzehender Nachtfalter mit borsligen Fühlhörnern und slachen Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA seticornis alis planis DECIMA OCTAVA.

 Achtzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und slachen Flügeln.
- Fig. IV. TIPVLA alis patentibus DECIMA SEPTIMA. Siebenzehende Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. V. VI. TENTHREDO antennis pedinatis SEXTA. Sechste Sägfliege mit gehämmten Fühlhörnern.
- Fig. VII. LEPTVRA thorace conico DECIMA SEPTIMA.

 Siebenzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Bruftschilde.
- Fig. VIII. ICHNEVMON SEXAGESIMVS QVINTVS. Fünf und sechzigste Schlupfwespe.

TABVLA CXXVII.

Hundert sieben und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO tetrapus alis integris SEPTIMVS.
 Siebender viersüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. VESPA VICESIMA. Zwanzigste Wespe.
- Fig. IV. V. PAPILIO tetrapus alis integris octavvs.

 Achter vierfüsiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. VI. VESPA VICESIMA PRIMA.

 Ein und zwanzigste Wespe.
- Fig. VII. MORDELLA PRIMA. Erster Flohkäfer.

TIBVLA CXXVII.





Fig. III.







Fig VI.



Loibel pince . R.

I. M. F. sc. R

TABULA CXXVIII.













Loibel pinx . R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CXXVIII.

Hundert acht und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA seticornis alis planis DECIMA NONA.

 Neunzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und slachen
 Flügein.
- Fig. III. BVPRESTIS DECIMA QVINTA. Vid. TAB. XLIX. Fig. I. Funfzehender Stinkkäfer.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace cylindraceo VNDECIMA. Eilfter Afterholzbock mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SEXTVS. sechs und fechzigfte Schlupfwefpe.
- Fig. VI. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SEPTIMVS. Sieben und sechzigste Schlupswespe.

TABVLA CXXIX.

Hundert neun und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA seticornis alis desexis TRICESIMA.

 Dreyssigster Nachtfalter mit borsligen Fühlhörnern und abhangenden

 Flügeln.
- Fig. III. MVSCA spathula antennarum rotunda DECIMA OCTAVA.

 Achtzehende Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. MVSCA spathula antennarum rotunda DECIMA NONA.

 Neunzehende Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. V. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA. Zwanzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VI.VII. PHALAENA seticornis alia desexis TRICESIMA PRIMA.

Ein und dregssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

TABVLA CXXIX.
















Loibel pinx . R.

I.G.F. sc. R.

TABVLA CXXX.













Loibel pinx R.

I.G.F.sc.R .

TABVLA CXXX. Hundert und dreyfsigfte Tafel.

- Fig. I. PHALAENA pedinicornis alis planis DECIMA TERTIA.

 Dreyzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen

 Flügeln.
- Fig. II. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA PRIMA.
 Ein und zwanzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. III. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA QVINTA. Funfzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. ICHNEVMON SEXAGESIMVS OCTAVVS. Acht und fechzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. TENEBRIO antennarum articulis lentiformibus QVARTVS. Vierter Mehlkäfer mit linfenförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. TABANVS SEPTIMVS. Siebende Bremsenfliege.

TABVLA CXXXI.

Hundert ein und dreyssigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA petinicornis alis deflexis VICESIMA QVINTA.

 Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. III, TABANVS OCTAVVS.

 Achte Bremfenfliege.
- Fig. IV. TABANVS Nonvs.

 Neunte Bremfenfliege.
- Fig. V. TABANVS DECIMVS. Zehende Bremfenfliege.
- Fig. VI. TABANVS VNDECIMVS. Eilfte Bremfenfliege.

TABVLA CXXXI.







Fig. III .





 \mathcal{F}_{ig} . V.



 \mathcal{F}_{ig} . IV .



 \mathcal{F}_{ig} . VI



Loibel pince . R .

TABVLA CXXXII.





 \mathcal{F}_{ig} . II .



Fig. III .





 \mathcal{F}_{ig} . V .

 \mathcal{F}_{ig} , VI ,



Loibel pinx . R

TABVLA CXXXII.

Hundert zwey und dreyssigste Tafel.

- Fig. I II. PAPILIO tetrapus alis angulatis QVARTVS.

 Vierter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. APIS QUADRAGESIMA. Vierzigste Biene.
- Fig. IV. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS NONVS. Neun und sechzigste Schlupswespe.
- Fig. VI. SPHEX QUARTA.
 Vierte Afterwespe.

TABVLA CXXXIII. Hundert drey und dreyfsigste Tafel.


Fig. I. PLATYCERVS QVARTVS. MAS. Vierter Kammkäfer. Männgen.

Fig. II. PLATYCERVS QVINTYS: FEMINA. Fünfter Kammkäfer. Weibgen.

Fig. III. IV. PHALAENA pedinicornis alis deflexis VICESIMA SEXTA.

Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

TABVLA CXXXIII














I.M.F.sc.R.

Loibel pinx R

TABVIA CXXXIV.



TABVLA CXXXIV.

Hundert vier und dreyssigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA seticornis alis desexis TRICESIMA SECVNDA.

zwey und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

Fig. III. a.b. CHELIFER PRIMVS.

Erste Scorpionspinne.

Fig. IV. a.b. CYNIPS PRIMA.

Erste Gallapfelfliege.

Fig. V. a.b. GYRINVS PRIMVS.

Erster Taumelkäfer.

Fig. VI. a.b. LEPISMA PRIMA.

Erster Zuckergast.

TABVLA CXXXV. Hundert fünf und dreyfsigfte Tafel.

Fig. I. PHALAENA petinicornis alis patentibus NONA.


Neunter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

- Fig. II. PHALAENA pettinicornis alis patentibus DECIMA.

 Zehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. III. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS. Siebenzigste Schlupswespe.
- Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS PRIMVS. Ein und fiebenzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. VI. SPHINX alis integris cauda pilofa QVARTA.

 Vierter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanze.

TABVLA CXXXV.



Loibel pince . R .

I. M. F. sc. R.

TABVIA CXXXVI.















Loibel pince . R

I. M. F. sc. R

TABVLA CXXXVI. Hundert fechs und dreyfsigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA pettinicornis alis deflexis VICESIMA SEPTIMA.

 Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. III. VESPA VICESIMA SECUNDA. Vid. TAB. LIII. Fig. V. Zwey und zwanzigste Wespe.
- Fig. IV. V. ACRIDIVM QUARTUM.

 Vierte Schnarrheufchrecke.
- Fig. VI. APIS QVADRAGESIMA PRIMA. Ein und vierzigste Biene.

TABVLA CXXXVII. Hundert fieben und dreyfsigfte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis patentibus DVODECIMA. Zwölftes Jüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. II. a.b. NEMOTELVS DECIMVS TERTIVS. Dreyzehende Stiletfliege.

Fig. III. CARABVS oblongus DECIMVS NONVS.

Neunzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. IV. V. ACRIDIVM QVINTVM.
Fünfte Schnarrheuschrecke.

TABVIA CXXXVII.



 $\mathcal{F}_{ig}.II.a$.







 \mathcal{F}_{ig} . III






Loibel poux . R



1. G. Fridrich sc . R .



Loibel pinx . R.

I. G. F. sc: R

TABVLA CXXXVIII.

Hundert acht und dreyssigste Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA QVINTA. MAS. Fünfte Heuschrecke. Männgen.

Fig. III. LOCVSTA SEXTA. FEMINA.
Sechste Heuschrecke. Weibgen.

Fig. IV. LOCVSTA SEPTIMA. Siebende Heuschrecke.

TABVLA CXXXIX.


Hundert neun und dreysfigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA pettinicornis alis deflexis VICESIMA OCTAVA.

Acht und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

Fig. III. LOCVSTA OCTAVA. FEMINA. Achte Heuschrecke. Weibgen.

Fig. IV. V. LOCVSTA NONA. MAS. Neunte Heuschrecke. Männgen.



TABVLA CXL.








Loibel pinx. R.





I.G.F.sc.R

TABVLA CXL.

Hundert und vierzigste Tafel.

Fig. I. STENOCORVS thorace armato SEXTVS. Sechster Stutzkäfer mit stachellichem Brustschilde.

Fig. II. III. PAPILIO hexapus alis integris NONVS.

Neunter fechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. V. PAPILIO hexapus alis integris DECIMVS.

Zehender sechssüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln. Vid. Tab. XL. Fig. III. IV.

TABVLA CXLI.

Hundert ein und vierzigste Tafel.

Fig. I. CARABVS oblongus vicesimvs.

Zwanzigster länglicher Laufkäfer.

Vid. TAB. XXXVI. Fig. I.

Fig. II. III. ACRIDIVM SEXTVM. Sechste Schnarrheuschrecke.

Fig. IV. V. ACRIDIVM SEPTIMVM. Siebende Schnarrheuschrecke.


TABVLA CXLI.











Loibel pince : R.

I. G. F. sc . R

TABVLA CXLII.









 $\mathcal{F}_{ig}.VI$.









TABVLA CXLII.

Hundert zwey und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO tetrapus alis angulatis QVINTVS.
 Fünfter vierfüsiger Tagfalter mit eckigen Flügeln,
- Fig. III. MVSCA spathula antennarum oblonga DECIMA SEPTIMA. Siebenzehende Haussliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. MVSCA spathula antennarum oblonga DECIMA OCTAVA.

 Achtzehende Haussliege mit länglichem Spadel.
- Fig. V. VI. ACRIDIVM OCTAVVM.

 Achte Schnarrheufchrecke. Vid. TAB. XXVII. Fig. VI. VII.

Fig. VII. a.b. CASSIDA SEXTA.

TABVLA CXLIII. Hundert drey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. . PAPILIO tetrapus alis integris NONVS.

Neunter viersiissiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO hexapus alis caudatis QVINTVS.
Fünfter sechsfüssiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. V. a.b. CYNIPS SECUNDA.
Zweyte Gallapfelfliege.

TABVLA CXLIII.











Fig. IV.





Loibel pince . R.

I.G.F.sc.R

TABVLA CXLIV.

















TABVLA CXLIV. Hundert vier und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA petinicornis alis deflexis VICESIMA NONA.

Neun und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

Fig. III. IV. FORFICVLA SECUNDA.

Zwegter Ohrkäfer.

Fig. V. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis TRICESIMVS.

Dreyssigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Fig. VI. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis TRICESIMVS PRIMVS. Ein und dreyssigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Fig. VII. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis TRICESIMVS SECVNDVS.

Zwey und dreyfsigfter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.

Fig. VIII. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis TRICESIMVS TERTIVS.

Drey und drey sigster Maulwurfskäfer mit drey spaltigen Fühlhörnern.

TABVLA CXLV.

Hundert fünf und vierzigste Tafel.

Fig. I. CERAMBYX DECIMVS QVINTVS. Funfzehender Holzkäfer.

Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis connolutis QVARTA.

Vierter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten

Flügeln.

Fig. IV. PHALAENA seticornis alis convolutis QVINTA.

Fünster Nachtsalter mit borstigen Fühlhürnern und zusammengerollten

Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA seticornis alis convolutis sexta.

Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten
Flügeln.

Fig. VII. VIII. PHALAENA seticornis alis convolutis SEPTIMA.

Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten
Flügeln.

TABVLA CXLV.



 \mathcal{F}_{ig} . II .



Fig. III .



 \mathcal{F}_{ig} . IV.



o iy. 1 v .



Fig. VI.



 $\mathcal{F}_{ig}.V
lap{1}$.




Loibel pince . R

I.G.F. sc. R

TABVLA CXLVI.















Loibel pinx . R .

I.G.F.sc.R.

TABVLA CXLVI. Hundert fechs und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO tetrapus alis angulatis sextvs.

Sechster vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. a.b. ACARVS QVARTUS. Vierte Milbe.

Fig. IV. NEMOTELVS DECIMVS QVARTUS. Vierzehende Stiletfliege.

Fig. V. MVSCA fpathula antennarum rotunda VICESIMA SECVNDA. Zwey und zwanzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VI. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA TERTIA.

Drey und zwanzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CXLVII.

Hundert sieben und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHEX QVINTA. Fünfte Afterweipe.

Fig. III. IV. PAPILIO tetrapus alis angulatis SEPTIMVS.
Siebender vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. V. CVLEX PRIMVS. FEMINA.

Erfte Schnaakenfliege. Weibgen.

Fig. VI. CVLEX SECUNDUS. MAS. Zweyte Schnaakenfliege. Männgen.

Fig. VII, VIII. EMPIS PRIMA. Erste Schnepfenfliege.

TABVLA CXLVII.





 \mathcal{F}_{ig} . II .











 \mathcal{F}_{ig} . VI .



Fig.VIII.



TABVLA CXLVIII.









TABVLA CXLVIII.

Hundert acht und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO tetrapus alis angulatis octavvs.

Achter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO tetrapus alis integris DECIMVS.

Zehender vierfüsiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CXLIX. Hundert neun und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis integris VNDECIMVS.

Eilfter jechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln,

Fig. III. PAPILIO hexapus alis integris DVODECIMVS.

Zwölfter sechsfüsiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. PAPILIO hexapus alis integris DECIMVS TERTIVS.

Dreyzehender fechsfüsiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CXLIX





Fig. II .





 \mathcal{F}_{ig} . IV .




Loibel pince . Rat .



I. M. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CL.



Loibel pinx. R

I. G. Fridrich sc . R.

TABVLA CL.

Hundert und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. III. BRANCHIPVS cancriformis PRIMVS. Erfter krebsartiger Kiefenfufs.

Fig. IV. a.b. BRANCHIPUS cancriformis secundus.

Zweyter krebsartiger Kiefenfuss.

Fig. V. a.b. BRANCHIPVS conchiformis PRIMVS. Erster muschelartiger Kiefenfuss.


TABVLA CLI. Hundert ein und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA seticornis alis planis VICESIMA.


 Zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. III. CLERVS QVARTVS.
 Vierter Bienenkäfer.
- Fig. IV. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis TRICESIMVS QVARTVSvier und dreyssigster Maulwurskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. VI. ELATER antennis ferratis DVODECIMVS.
 Zwölfter Springkäfer mit fägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. LEPTVRA thorace globoso DECIMA QVARTA.

 Vierzehender Afterholzkäfer mit kugelichem Bruftschilde.

TABVLA CLI.



TABVLA CLII.



Loibel pinx . Rat

I. M. Fridrich se. Rat.

TABVLA CLII.

Hundert zwey und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO tetrapus alis integris VNDECIMVS.

Eilfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. PAPILIO tetrapus alis integris DVODECIMVS zwölfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. LEPTVRA thorace cylindraceo DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzhäfer mit walzenähnlichem Bruftschilde.

TABVLA CLIII.

Hundert drey und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO tetrapus alis integris DECIMVS TERTIVS.

 Dreyzehender vierfüsiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. TETIGONIA TERTIA.

 Dritte Singfliege.
- Fig. IV.a.b. CERAMBYX DECIMVS SEXTVS. Vid. TAB. I. Fig. I. Sechzehender Holzkäfer.
- Fig. V. LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA TERTIA.

 Dreyzehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.

 Vid. TAB, XXXIX. Fig. I.

TABVLA CLIII.





 \mathcal{F}_{ig} . III .







Loibel pinx . Rat.

I. M. Fridrich se . Rat

TABVLA CLIV

 \mathcal{F}_{ig} . I .



 $\mathcal{F}_{ig}.II$.



 $\mathcal{F}_{ig}.III$.



Fig. IV.



 $\mathcal{F}_{ig}.VII$.



 \mathcal{F}_{ig} . VIII .



 $\mathcal{F}_{ig}.VI$.

Fig. \overline{V} .



Fig. IX.

Fig. X .

Loibel pinx . Rat.

I.M.F.sc . Rat .

TABVLA CLIV.

Hundert vier und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. EPHEMERA TERTIA.

Dritte Vferaassliege.

Fig. III. IV. TENTHREDO antennis pettinatis SEPTIMA. MAS. Siebende Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern. Männgen.

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis pellinatis octava. FEMINA. Achte Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern. Weibgen.

Fig. VII. VIII. PHALAENA seticornis alis destexis TRICESIMA TERTIA.

Drey und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

Fig. IX. X. ACRIDIVM NONVM.

Neunte Schnarrheuschrecke.

TABVLA CLV.

Hundert fünfund funfzigste Tafel.

- Fig. I. ONISCVS TERTIVS.

 Dritte Affel.
- Fig. II. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS SEXTVS.
 Sechs und zwanzigster Rüffelküfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. III. a.b. BRVCHVS PRIMVS. Erster Buckelkäfer.
- Fig. IV. a.b. BRVCHVS secvndvs. Zweyter Buckelkäfer.
- Fig. V. a.b. BRVCHVS TERTIVS.
 Dritter Buckelkäfer.
- Fig. VI. BLATTA SECUNDA. Zweyte Schabe.
- Fig. VII. BLATTA TERTIA. Dritte Schabe.

TABVLA CLV.



Loibel pince . Rat

TABVLA CLVI.



















TABVLA CLVI.

Hundert fechs und funfzigste Tafel.

- Fig. I. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA QVARTA. Vier und zwanzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. III. EPHEMERA QVARTA. Vierte Uferaasfliege.
- Fig. IV. CARABVS oblongus VICESIMVS PRIMVS. Ein und zwanzigster länglicher Laufkäfer.
- Fig. V. VI. PHALAENA seticornis alis destexis TRICESIMA QVARTA.

 vier und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VII. TIPVLA alis patentibus DECIMA OCTAVA, Achtzehende Erdfliege mit offenen Flügeln,

TABVLA CLVII.

Hundert sieben und funfzigste Tafel.

Fig. I. BVPRESTIS DECIMA SEXTA. Sechzehender Stinkkäfer.


Fig. II. III. GRYLLVS SECVNDVS. MAS. Zweyte Grille. Männgen.

Fig. IV. GRYLLVS TERTIVS. FEMINA. Dritte Grille. Weibgen.

Fig. V. VI. PHRYGANEA SEPTIMA. Siebende Frühlingsfliege.

Fig. VII. a.b. DERMESTES quintus. Finnfter Speckkäfer.

TABVLA CLVII.



Loibel pince . Rat

I. M. F. sc . Rat .

TABVLA CLVIII.





Fig. III. a







Fig. III. b





Loibel pinx Rat

 $\mathcal{F}_{ig}.VI$.

I. M. Fridrich sc . Rat

TABVLA CLVIII. Hundert acht und funfzigste Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA QVARTA.

 Vierzehender Afterholzkäfer mit walzeaähnlichem Brustschilde.
- Fig. II. BLATTA QVARTA, Vierte Schabe.
- Fig. III. a.b. CISTELA SECUNDA. Zweyter Kegelkäfer.
- Fig. IV. V. PAPILIO hexapus alis caudatis SEXTVS.
 Sechster fechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ quadrato SEPTIMA. Siebende Spinne mit Augen im Vierecke.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ quadrato OCTAVA.

 Achte Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CLIX. Hundert neun und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA pettinicornis alis erettis VICESIMA.

Zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und aufrechten
Flügeln.

Fig. III. IV. TENTHREDO antennis pedinatis NONA. Neunte Sägsliege mit gekämmten Fühlhörnern.

Fig. V. PTEROPHORVS SECUNDUS. Zweyter Fächerfalter.

Fig. VI. VII. PHALAENA seticornis alis planis VICESIMA PRIMA.

Ein und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA CLIX.











 \mathcal{F}_{ig} . V .



 $\mathcal{F}_{g}[T]$








Loibel pinx . Rat .

I. M. Fridrich se . Rat

TABVIA CLX.









Loibel pina . Rat.

I. M. Fridrich sc. R.

TABVLA CLX. Hundert und fechzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis patentibus DECIMA TERTIA.

Dreyzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. II. III. PERLA TERTIA.

Dritte Afterfrühlingsfliege.

Fig. IV. V. APIS QUADRAGESIMA SECUNDA.

Zwey und vierzigste Biene.


Fig. VI. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXI. Hundert ein und sechszigste Tafel.

- Fig. I. TIPVLA alis patentibus DECIMA NONA. MAS. Neunzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. II. III. ACRIDIVM DECIMVM. Zehende Schnarrheuschrecke.
- Fig. IV. CHRYSOMELA TRICESIMA SECUNDA. Zwey und dreyfsigster Blattkäfer.
- Fig. V. MVSCA fpathula antennarum rotunda VICESIMA QVINTA.

 Finf und zwanzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. ARANEA oculorum fitu semilunato DECIMA QVARTA. Vierzehende Spinne mit Augen im halben Monde.


TABVLA CLXI.



Loibel pinx . Rat.

I. M. Fredrich sc. Rat.

TABVLA CLXII.



TABVLA CLXII.

Hundert zwey und fechzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis obliquis PRIMVS.

Erster sechssüssiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO hexapus alis obliquis SECVNDVS.

Zweyter sechssissiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.

Fig. V. TIPVLA alis patentibus VICESIMA. FEMINA.

Zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

Fig. VI. TIPVLA alis patentibus VICESIMA PRIMA. MAS. Ein und zwanzigste Erdsliege mit offenen Flügeln. Männgen.

Fig. VII, VIII. PAPILIO hexapus alis obliquis TERTIVS.

Dritter fechsfüßiger Tagfalter mit schiefen Flügeln,

TABVLA CLXIII. Hundert drey und fechzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO semoribus muticis VICESIMVS OCTAVVS.

 Acht und zwanzigster Rüsselkäser mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis planis vicesima secunda.

 Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
 flachen Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA feticornis alis planis VICESIMA TERTIA.

 Drey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und fachen Flügeln.
- Fig. VI. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS NONVS.

 Neun und zwanzigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXIII.

















Fig.VI .



TABVLA CLXIV.







Fig. IV.



 $\mathcal{F}_{ig}.VI$:



 \mathcal{F}_{ig} . V .



Fig. III .



 $\mathcal{F}_{ig}.VII$.



Loibel pince . Rat. .

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CLXIV. Hundert vier und sechzigste Tafel.

- Fig. I. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA SEXTA.

 Sechs und zwanzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. III. PAPILIO tetrapus alis integris DECIMVS QVARTVS.

 Vierzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA seticornis alis desexis TRICESIMA QVINTA.

 Fünf und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VI. VII. PHALAENA seticornis alis planis VICESIMA QVARTA.

 Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA CLXV. Hundert fünfund fechzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis ocellatis SEPTIMVS.
Siebender sechssissiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. III. IV. SPHINX alis integris cauda simplici DECIMA TERTIA.

Dreyzehender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem
Schwanze.


Fig. IV. PHALAENA seticornis alis destexis TRICESIMA SEXTA.

Sechs und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und

abhangenden Flügeln.

Fig. VII. VIII. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA SEPTIMA. Sieben und zwanzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CLXV.



TABVLA CLXVI:





Fig. III . a .



Fig.IV.a



Fig. III. 3.





Loibel pinx . Rat .

I. M. Fredrich sc. R.

TABVLA CLXVI.

Hundert fechs und fechzigste Tafel.

Fig. I. II. NEMOTELVS DECIMVS QVINTVS. Funfzehende Stiletfliege.

Fig. III. a. b. CVRCVLIO femoribus muticis TRICESIMVS.

Dreyfsigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. VI. a.b. CLERVS QVINTVS.
Fünfter Bienenkäfer.

Fig. V. a.b. ALTICA PRIMA. Erster Hüpfkäfer.


TABVLA CLXVII.

Hundert sieben und sechzigste Tafel.

- Fig. I. DERMESTES SEXTVS. Sechster Speckkäfer.
- Fig. II. III. MVSCA fpathula antennarum rotunda VICESIMA OCTAVA.

 Acht und zwanzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. LIBELLVLA alis patentibus DECIMA QUARTA. Vierzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. V. VI. TENTHREDO antennis fetaceis DVODECIMA. Zwölfte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. ARANEA oculorum fitu femilunato DECIMA QVINTA. Funfzehende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CLXVII.



Loibel pinx . Rat.

I. M. Fridrich sc . Rat .

TABULA CLXVIII.

 \mathcal{F}_{ig} . I .



Fig. II.



Fig. III .



 \mathcal{F}_{ig} . IV.



 \mathcal{F}_{ig} V.

 \mathcal{H}_{ig} . VI .



 \mathcal{F}_{ig} . VIII .



Loibel pinx . Rat .

7 34 Fridrich sc . Rat.

TABVLA CLXVIII.

Hundert acht und fechzigste Tafel.

Fig. I. BOMBYLIVS octavvs.

Achte Rüffelfliege.

Fig. II. III. PHRYGANEA octava.

Achte Frühlingsfliege.

Fig. IV. V. NEMOTELVS DECIMVS SEXTVS. Sechzehende Stiletsliege.

Fig. VI. VII. PAPILIO hexapus alis ocellatis octavvs.

Achter sechssüssiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. VIII. ICHNEVMON SETTVAGESIMVS SECVNDVS.

Zwey und fiebenzigste Schlupfwespe.

TABVLA CLXIX.

Hundert neun und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. III. MVSCA spathula antennarum quadrata PRIMA. Erste Haussliege mit viereckigem Spadel.

Fig. IV. V. MVSCA spathula antennarum oblonga DECIMA NONA.

Neunzehende Haussliege mit länglichem Spadel,

Fig. VI. a.b. CVRCVLIO femoribus muticis TRICESIMVS PRIMVS.

Ein und dreyssigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. VII. CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS QVINTVS.

Fünf und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA CLXIX.



















Loibel pina. Rat.

I. M. Fridrich sc . Rat

TABVLA CLXX.

Fig. I .



Fig. II.

Fig. IV.



Fig. V.



 \mathcal{F}_{ig} . VI .



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.



 $\mathcal{F}_{ig}.VIII$.



Fig. IX.

I.G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CLXX.

Hundert und fiebenzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus muticis TRICESIMVS SECVNDVS.

 Zwey und dreysigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. III. TENTHREDO antennis setaceis DECIMA TERTIA. Dreyzehende Sügfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. V. CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS SEXTVS. Sechs und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. VII. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA NONA.

 Neun und zwanzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VIII. IX. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA.

 Dreysigste Haussliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CLXXI.

Hundert ein und siebenzigste Tafel.

Fig. I. a.b. COCCINELLA VICESIMA. Zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. II. a.b. COCCINELLA VICESIMA PRIMA.

Ein und zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. III. a.b. RHINOMACER DECIMVS QVINTUS. Funfzehender Afterrüffelkäfer.

Fig. IV. V. VI. PHRYGANEA NONA. Neunte Frühlingsfliege.

TABVLA CLXXI.

Fig.I.a.

Fig. II.a.

Fig. I.b.



Fig. III . a .



Fig. II. b.



Fig. III. b.



Fig. IV.

Loibel pinx . Rat.



Fig VI.



Fig. V.

I.G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CLXXII.

 \mathcal{F}_{ig} . I



Fig. II ..



 \mathcal{F}_{ig} . III .





 \mathcal{F}_{ig} . V .





 \mathcal{F}_{ig} , VII .



Loibel pince. Rat.

I.M. Fridrich sc. R.

TABVLA CLXXII.

Hundert zwey und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis integris DECIMVS QVARTVS.

 Vierzehender fechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA PRIMA.

 Ein und dreyssigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. V. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA SECVNDA.

 Zwey und dreyjsigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA SEXTA. Sechzehende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ quadrato NONA.

 Neunte Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CLXXIII. Hundert drey und fiebenzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA TERTIA.

Drey und dreyssigste Haussliege mit rundlichem Spadel.

Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis planis VICESIMA QVINTA.

Fin f und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. IV. a.b. CHRYSOMELA TRICESIMA TERTIA.

Fig. V. VI. Zwegter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und aufrechten Flügeln.

TABVLA CLXXIII:





Fig. II .



 $\mathcal{F}_{ig}.III$

Fig. IV. a.



1

 $\mathcal{F}_{ig}.VI$.



 \mathcal{F}_{ig} . V .



Fig. IV. b



I. M. Fridrich se . Rat

TABVIA CLXXIV.



Fig. II.



 \mathcal{F}_{ig} . V . b .

Fig.III.



 \mathcal{F}_{ig} . IV



 \mathcal{F}_{ig} . V . a .



Loibel pince . Rat . .

I.G.F.sc.R.

TABVLA CLXXIV. Hundert vier und fiebenzigfte Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis patentibus DECIMA QVINTA. Funfzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA SEPTIMA. Siebenzehende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. III. ARANEA oculorum situ quadrato DECIMA. Zehende Spinne mit Augen im Vierecke.
- Fig. IV. ELATER antennis setaceis DECIMVS. Zehender Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. V. a.b. CVRCVLIO femoribus muticis TRICESIMVS TERTIVS.

 Drey und dreyssigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXXV. Hundert fünf und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. EPHEMERA QVINTA. MAS. Fünfte Uferaasfliege. Männgen.
- Fig. III. EPHEMERA SEXTA. FEMINA. Sechste Uferaasfliege. Weibgen.
- Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS TERTIVS. FEMINA, aptera.

 Drey und fiebenzigste Schlupswespe. Weibgen, ohne Flügel.
- Fig. V. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS QVARTVS. MAS, alatus.

 Vier und fiebenzigste Schlupswespe. Männgen, mit Flügeln.
- Fig. VII. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS QVINTUS. Finf und fiebenzigste Schlupfwespe.

TABVLA CLXXV.















Loibel pince . R.

I.G. F. sc . R.

TABVLA CLXXVI.



Fig. II.



Fig. IV.a.



Fig VI.

Fig. IV. b





Loibel pinx . R.

I.G.F.sc.R.

TABVLA CLXXVI.

Hundert fechs und fiebenzigste Tafel,

Fig. I. LIBELLVLA alis eredis DECIMA QVINTA. Funfzehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. II. III.

PHALAENA seticornis alis planis vicesima sexta.

Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und

flachen Flügeln.

Fig. IV. a.b. ANTHRENVS PRIMVS.

Erster Blumenstaubkäfer.

Fig. V. a.b. CERAMBYX DECIMVS SEPTIMVS. Siebenzehender Holzkäfer.

Fig. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEXTVS. FEMINA, aptera. Sechs und siebenzigste Schlupswespe. Weibgen, ohne Flügel.

TABVLA CLXXVII.

Hundert sieben und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA QVARTA.

 Vier und Areyssigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. III. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA QVINTA. Fünf und dreyssigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEPTIMVS. Sieben und fiebenzigste Schlupswespe.
- Fig. V. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS OCTAVVS.

 Acht und fiebenzigste Schlupswespe.

Fig. VI. VII. SPHEX SEXTA. Sechste Afterweipe.

Fig. VIII. IX. SPHEX SEPTIMA.

Siebende Afterwespe.

TABVLA CLXXVII.






























Loibel pinx . R.

I.M.F sc.Rat

TABVLA CLXXVIII.



Loibel pinx R.

I. M. Fridrich sc. R.

TABVLA CLXXVIII. Hundert acht und fiebenzigste Tafel.

Fig. I. II. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA SEXTA. Sechs und dreyssigste Haussliege mit rundlichem Spadel.

Fig. III. IV. PHALAENA pettinicornis alis deflexis TRICESIMA. MAS.

Dreyfsigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangenden
Flügeln. Männgen.

Fig. V. VI. PHALAENA petinicornis alis deflexis TRICESIMA PRIMA. FEMINA. Ein und dreyssigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangenden Flügeln. Weibgen.

TABVLA CLXXIX. Hundert neun und fiebenzigste Tafel.

- Fig. I. TENTHREDO antennis filiformibus SEXTA.

 Sechste Sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. II. III. MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA. Zwanzigste Haussliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. V. PHALAENA seticornis alis destexis TRICESIMA SEPTIMA.

 Sieben und dreysigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

Fig. VI. VII. NEMOTELVS DECIMVS SEPTIMVS. Siebenzehende Stiletfliege.

Fig. VIII. IX. Dritte Pferdfliege.

TABVLA CLXXIX.

 $\mathcal{F}_{ig}.I.$



 $\overleftarrow{\mathcal{F}_{ig}}.II$.



Fig. III

Fig. IV.



Fig.VI.



Erig. VIII



Little for Ret

TABVLA CLXXX.













TABVLA CLXXX.

Hundert und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PHRYGANEA DECIMA. Zehende Frühlingsfliege.

Fig. III. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA SEPTIMA.

sieben und dreyssigste Haussliege mit rundlichem Spadel.

Vid. TAB. CLXXIII. Fig. I. II.

Fig. IV. V. PHALAENA seticornis alis planis VICESIMA SEPTIMA.

Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS NONVS.

Neun und siebenzigste Schlupswespe.

TABVLA CLXXXI.

Hundert ein und achtzigste Tafel.

- Fig. I. TIPVLA alis patentibus VICESIMA SECVNDA. FEMINA.

 Zwey und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. II. TIPVLA alis patentibus VICESIMA TERTIA. FEMINA.

 Drey und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. III. TIPVLA alis patentibus VICESIMA QVARTA. MAS.


 Vier und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. IV. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA OCTAVA.


 Acht und dreyssigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. V. VI. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA SEXTA. Sechzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. MVSCA spathula antennarum oblonga vicesima PRIMA.

 Ein und zwanzigste Haussliege mit länglichem Spadel.

TABVIA CIXXXI.







 \mathcal{F}_{ig} , V



 \mathcal{F}_{ig} .VI.







Loibel pinx . R.

, I.M.F.sc.R.

TABVIA CLXXXII.















Loibel pinx . R .

I. M.F. sc.R.

TABVLA CLXXXII.

Hundert zwey und achtzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVI. A alis patentibus DECIMA SEXTA.
 Sechzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln,
- Fig. II. III. TABANVS DVODECIMVS. Zwölfte Bremfenfliege.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace conico DECIMA OCTAVA.

 Achtzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. VI. PHALAENA seticornis alis planis VICESIMA OCTAVA.

 Acht und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
 flachen Flügeln.

TABVLA CLXXXIII. Hundert drey und achtzigfte Tafel.

- Fig. I. CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS SEPTIMVS.

 Sieben und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. II. III. PAPILIO tetrapus alis integris DECIMVS QVINTVS.

 Funfzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. TIPVLA alis patentibus VICESIMA QVINTA. FEMINA.
 Fünf und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. V. TIPVLA alis patentibus VICESIMA SEXTA. MAS. Sechs und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. VI. ASIL VS DECIMVS QVINTVS. Funfzchende Raubfliege.
- Fig. VII. ICHNEVMON octogesimvs.

 Achtzigste Schlupswespe.

TABVLA CLXXXIII.









 $\mathcal{F}_{ig}.III$.







TABVIA CLXXXIV.











Loibel pince. R.

I.G. Esc. R.

Fig. III .

· TABVLA CLXXXIV. Hundert vier und achtzigste Tafel.

LIBELLVLA alis erectis Decima senta.

Fig. I. Sechzehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. II. III. PAPILIO hexapus alis integris DECIMVS QVINTVS
Funfzehender sechsfüsiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. V. TABANVS DECIMVS TERTIVS. Dreyzehende Bremsensliege.

Fig. VI. VII. TABANVS DECIMVS QUARTUS. Vierzehende Bremfenfliege.

TABVLA CLXXXV.

Hundert fünfund achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis ocellatis NONVS.

Neunter sechsfüsiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. III. ASILVS DECIMVS SEXTVS. Sechzehende Raubfliege.

Fig. IV. a.b. V. CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS OCTAVVS. Acht und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA CLXXXV









Fig. III

 \mathcal{F}_{ig} . IV.





Fig. V.b.



I.G.F. sc.R.

Loibel pince. R.

TABVLA CLXXXVI.



 \mathcal{F}_{ig} . IV.



 \mathcal{F}_{ig} . II .



 \mathcal{F}_{ig} . V.



Fig. III .



Loibel pince . R

I.G. F. sc. R.

TABVLA CLXXXVI. Hundert fechs und achtzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis patentibus DECIMA SEPTIMA. Siebenzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. TENTHREDO antennis fetaceis DECIMA SEPTIMA. Siebenzehende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. III. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA OCTAVA. Achtzehende Sägfliege mit käulfürmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. CLEROIDES PRIMVS.
 Erster Afterbienenkäfer.
- Fig. V. CLEROIDES SECUNDUS.

 Zweyter Afterbienenkäfer.

TABYLA CLXXXVII.

Hundert sieben und achtzigste Tafel.

- Fig. I. a.b. ICHNEVMON OCTOGESIMVS PRIMVS.

 Ein und achtzigste Schlupswespe.
- Fig. II. III. WVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA SECVNDA. Zwey und zwanzigste Haussliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS QVARTVS. Vier und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. V. ARANEA oculorum situ quatuor linearum TERTIA.

 Dritte Spinne mit Augen in vier Reihen.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ quatuor linearum QVARTA. Vierte Spinne mit Augen in vier Reihen.
- Fig. VII

 ARANEA oculorum fitu semilunato DECIMA OCTAVA.

 Achtzehende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CLXXXVII.








 \mathcal{F}_{ig} . III .



 \mathcal{F}_{io}^{\cdot} IV.



,



Fo VII.



Loibel pina. R.

I.G. F. se R.

TABVLA CLXXXVIII.





Fig. III a.



Fig. 1V.



 \mathcal{F}_{ig} . V.



Fig. III. b.



 $\mathcal{F}_{g}.VI$



F. VII



oibel pinx . R

I.G. F. sz. R

TABVLA CLXXXVIII.

Hundert acht und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. NEMOTELVS DECIMVS OCTAVVS.

Achtzehende Stiletfliege.

Fig. III. a.b. NOTOXVS PRIMVS.

Erster Brusthornkäfer.

Fig. IV. V. MVSCA spathula antennarum oblonga vicesima tertia.

Drey und zwanzigste Haussliege mit länglichem Spadel.

Fig. VI. VII. CVLEX TERTIVS.

Dritte Schnaakenfliege.

TABVLA CLXXXIX.

Hundert neun und achtzigste Tafel.

- Fig. I. BOSTRICHVS PRIMVS. Erster Capuzkäfer.
- Fig. II. LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA QVINTA.
 Funfzehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Bruftschilde.
- Fig. III. a. b. TELEPHORVS ouatus sextvs. Sechster cyrunder Warzenkäfer.
- Fig. IV. V. PHALAENA seticornis alis deservis TRICESIMA OCTAVA.

 Acht und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VI. ARANEA oculorum fitu quatuor linearum QVINTA. Fünfte Spinne mit Augen in vier Reihen.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA NONA.

 Neunzehende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CLXXXIX.





Fig. III. a.







Fig. III . b .







I.M.F.sc.R.



Loibel pince . R

TABVLA CXC.















Loibel pince . R.

I.M.F.sc. R.

TABVLA CXC.

Hundert und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA. MAS. Zehende Heuschrecke. Männgen.
- Fig. III. LIBELLVLA alis patentibus DECIMA OCTAVA, Achtzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. IV. V. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA NONA. Neunzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. APIS QUADRAGESIMA TERTIA.

 Drey und vierzigste Biene.
- Fig. VII. VESPA VICESIMA TERTIA.

 Drey und zwanzigste Wespe.

TABVLA CXCI. Hundert ein und neunzigste Tafel.

Fig. I. NEMOTELVS DECIMVS NONVS. Neunzehende Stiletfliege.


Fig. II. III. TENTHREDO antennis setaceis DECIMA QUARTA. Vierzehende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.

Fig. IV. ARANEA oculorum situ quadrato VNDECIMA. Eilste Spinne mit Augen im Vierecke.

Fig. V. VI. NEMOTELVS VICESIMVS. Zwanzigste Stiletsliege.

Fig. VII. VIII. NEMOTELVS vicesimvs primvs. Ein und zwanzigste Stiletsliege.

TABVLA CXCI.



TABVLA CXCII.





Fig. II.

Fig. III. a.

Fig. III. b.



Fig. IV.

 \mathcal{F}_{ig} , VI .





Loibel pinx. R

I. M. F. sc . R.

TABVLA CXCII.

Hundert zwey und neunzigste Tafel.

Fig. I. EMPIS SECUNDA.

Zweyte Schnepfenfliege.

Fig. II. EMPIS TERTIA.

Dritte Schnepfenfliege.

Fig. III. a.b. EMPIS QVARTA.
Vierte Schnepfenfliege.

Fig. IV. V. APIS QUADRAGESIMA QUARTA. Vier und vierzigste Biene.

Fig. VI. CERAMBYX DECIMVS OCTAVVS.

Achtzehender Holzkäfer.

TABVLA CXCIII.

Hundert drey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. PHALAENA seticornis alis patentibus DVODECIMA.
 Zwölfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. II. III. MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA QVARTA. Vier und zwanzigste Haussliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. V. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA NONA.

 Neun und dregssigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. VII. WVSCA spathula antennarum rotunda QVADRAGESIMA.

TABVLA CXCIII.















Loibel pinx. R.

I.M.F.sc.R

TABVLA CXCIV.

 $\mathcal{F}_{ig}.I.$



 $\mathcal{F}_{ig}.II$.



Fig. III .



Fig. IV.





 \mathcal{F}_{ig} VII .



 \mathcal{F}_{ig} .VI .



Loibel pince. R.

I.M.F.sc.R.

TABVLA CXCIV. Hundert vier und neunzigste Tafel.

- Fig. I. ELATER antennis fetaceis VNDECIMVS. Eilfter Springkäfer mit borftigen Fühlhörnerne.
- Fig. II. III. TENTHREDO antennis clauatis VICESIMA.

 Zwanzigste Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. CHRYSOME LA TRICESIMA QVARTA.

 Vier und dreyfsigster Blattkäfer.
- Fig. V. VI. PHALAENA seticornis alis planis VICESIMA NONA.

 Neun und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und

 stachen Flügeln.
- Fig. VII. CARABVS oblongus vices imvs secundus.

 Zweg und zwanzigster länglicher Lauskäfer.

TABVLA CXCV. Hundert fünf und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. MVSCA spathula antennarum rotunda QVADRAGESIMA PRIMA.

Ein und vierzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.

Fig. III. IV. ICHNEVMON octogesimvs secvndvs.

Zwey und achtzigste Schlupfwespe.

Fig. V. VI. PHALAENA seticornis alis planis TRICESIMA.

Dreysigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VII. VIII. APIS QVADRAGESIMA QVINTA.

TABVLA CXCV.

















Fig.VII.

I.M.F. sciR.

Loibet pinx . R.

TABVLA CXCVI.





Fig. III .





 \mathcal{F}_{ig} . VI .



Loibel pinx. R.

Fig. IV.

I.M.F.sc.R.

TABVLA CXCVI. Hundert fechs und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA f ticornis alis planis TRICESIMA PRIMA.

Ein und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Fügeln.

Fig. III. TIPVLA alis patentibus VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigste Erdsliege mit offenen Flügeln,

Fig. IV. V. PHRYGANEA UNDECIMA, Eilfte Frühlingsfliege.

Fig. VI. ARANEA oculorum fitu quadrato DVODECIMA. Zwölfte Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CXCVII.

Hundert sieben und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. TENTHREDO antennis setaceis DECIMA QVINTA. Funfzehende Sügfliege mit borstigen Fühlhürnern.

Fig. III. IV. PHALAENA seticornis alis planis TRICESIMA SECVNDA.

Zwey und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. V. VI. APIS QUADRAGESIMA SEXTA. Sechs und vierzigste Biene.

Fig. VII. VIII. MVSCA spathula antennarum rotunda QVADRAGESIMA SECVNDA.

Zwey und vierzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CXCVII.

















Loibel pince . R.

I.G.F. sc.R.

TABVLA CXCVIII.





















Loibel pinx . R.

I.G.F.sc.R.

TABVLA CXCVIII. Hundert acht und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. APIS QUADRAGESIMA SEPTIMA. sieben und vierzigste Biene.
- Fig. III. ICHNEVMON octogesimvs tertivs.

 Drey und achtzigste Schlupswespe.
- Fig. IV. V. STRATIOMYS DECIMA. Zehende Waffenfliege.
- Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS QVINTVS.
 Fünf und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VII. LEPTURA thorace conico DECIMA NONA.

 Neunzehender Afterholzkäfer.
- Fig. VIII. SCARABAEVS tribus antennarum samellis TRICESIMVS QVINTVS.
 Fünf und dreyssigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

TABVLA CXCIX. Hundert neun und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS NONVS.

 Neun und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. III. ARANEA oculorum fitu femilunato VICESIMA.

 Zwanzigjte Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. IV. V. CIMEX quatuor antennarum articulis TRICESIMVS.

 Dreyssigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. VII. CIMEX quatuor antennarum articulis TRICESIMVS PRIMVS. Ein und dreafsigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. ELATER antennis ferratis DECIMVS TERTIVS.

 Dreyzehender Springkäfer mit fägförmigen Fühlhörnern.

TABVLA CXCIX.





Fig. III.



Fig.V.

Fig. IV.

Fig. VIII .



 $\mathcal{F}_{ig}.VII$.





Loibel pince . R.

I.G.F.sc.R.

TABVLA CC.



 \mathcal{F}_{ig} . II .



 $\mathcal{F}_{ig}.IV.$





 $\mathcal{F}_{ig}.VII$.



Fig. III .



 $\mathcal{F}_{ig}.VI$.



Loibel pinx. R.

I.G.F.sc.R.

TABVLA CC. Zweyhundertste Tafel.

- Fig. I. NEMOTELVS VICESIMVS SECVNDVS. Zwey und zwanzigste Stiletsliege.
- Fig. II. TENTHREDO antennis clauatis VICESIMA PRIMA.

 Ein und zwanzigste Sägsliege mit käulförmigen Fühlhörnera.
- Fig. III. TENTHREDO antennis fetaceis DECIMA SEXTA.

 Sechzehende Sägfliege mit borftigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. PHALAENA seticornis alis patentibus DECIMA TERTIA.

 Dreyzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. V. VI. MVSCA spathula antennarum rotunda QVADRAGESIMA TERTIA.

 Drey und vierzigste Haussliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VII. ARANEA oculorum fitu femilunato VICESIMA PRIMA.

 Ein und zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde.

